

Az OH 2020/9. számában megjelent kvíz megoldásai:

1. A, 2. C, 3. B, 4. C, 5. A, 6. D, 7. D, 8. D, 9. B, 10. D

Indoklások:

1. A) A dohányzás az egészségkárosodás egyik világméretű kockázati tényezője. A cigaretta és az egyéb dohánytermékek számos olyan anyagot tartalmaznak, amelyek szövetkárosító, illetve karcinogén hatásúak. A dohányzás az összes rákhalálozás 30–35%-áért felelős.
2. C) A praediabetes a 2-es típusú cukorbetegség körmelegelő állapot, amely a normálvércukorszintet meghaladó, de a diabetes mellitus diagnosztikai kritériumait el nem érő plazmaglükózértékek esetén mondható ki. Az ADA ajánlása alapján az 5,6 mmol/l éhomi vércukorszint esetén emelkedett éhomi vércukorszint véleményezhető.
3. B) A koleszterin granuloma a szervezet idegentestreakciója a koleszterinkristályokkal szemben, amelyek a vér és a környező szövetek lebomlása során keletkeznek. A szervezetben a leggyakrabban a temporális csontban fordul elő.
4. C) A *Streptococcus pyogenes* által okozott fertőzés képes hiperakut kezdettel és kórlefelgyárral, vagyis kevesebb mint 24 óra alatt immunkompetens egyén halálához vezetni. A streptococcalis shock szindróma a *S. pyogenes*-fertőzések komplikációjaként léphet fel, és rövid idő alatt sokszervi elégtelenséghez vezethet. A fertőzés kimenetelét a baktérium virulenciafaktorai határozhatják meg. A streptolizin a baktérium exotoxinja.
5. A) Az újszülöttkori mellékvesevérzés gyakoriságát korábban 1,7–1,9/1000 szülés arányban határozták meg. Az elváltozások többsége jobb oldali, amelyet a jobb mellékvesevéna rövidebb lefutásával magyaráznak.
6. D) A 2011-ben megfogalmazott ajánlás világosan meghatározza azokat a körülményeket, amelyek esetében a placenta feldolgozása szükséges. Mindhárom esetben szükséges a placenta patológiai feldolgozása.
7. D) Az enteroendokrin sejtek a béltraktus egészében kimutathatók; összességében több mint 20 peptidhormont szekretálnak, amelyek a táplálékfelvételt is befolyásolják. Az inzulinszerű peptid-5 a táplálékfelvételt növeli.
8. D) A Ménière-betegség jellemző tünetei a hártály labirintusban megjelenő hydrops következtében alakulnak ki. Jellemzői a heves, forgó jellegű szédüléssel rohamok, fülzúgás, sensorineurális halláscsökkenés, hányinger, hányás, illetve bizonyos esetekben fejfájás. A betegek életminősége szempontjából a legmeghatározóbb a heves, forgó jellegű szédülés, valamint a társuló vegetatív, cochlearis tünetek.
9. B) Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések prevalenciája jelentős mértékű. Az intenzív orvosi eszközök használatával és kritikus betegek esetében még gyakoribb, az intenzív osztályokon kb. a betegek 51%-át érinti.
10. D) A szemsérüléseknek számos kockázati tényezője ismert. Az életkor esetén két korcsoport körében mutattak ki nagyobb kockázatot (5–25 évesek, illetve 70 éves kor felettek). A férfiak dominanciája jellemző. Az alacsonyabb életszínvonal, valamint az iparosodott társadalom további kockázati tényezőnek tekinthető.

Az OH-KVÍZ megfejtesével folyamatos orvos-továbbképzési pontokhoz juthat!

A Semmelweis Egyetem Továbbképző Központjának döntése értelmében az OH-KVÍZ megfejtesének beküldői folyamatos orvos-továbbképzési pontokat kapnak.

Amennyiben a jó válaszok aránya meghaladja a 60%-ot, kvízenként 2, fél évente maximum 12 továbbképzési pont kapható. Távoktatással szerzett pontokból évente legfeljebb 20 pont számítható be [MK 2003/99. (VIII. 22.)].

A 100%-osan helyes választ beküldők jutalma egy, az Akadémiai Kiadó webáruházában kedvezményes vásárlásra jogosító kupon.

A megfejtesek az *Orvosi Hetilap* szerkesztőségébe levelezőlapra és e-mailen küldhetők be.

A beküldött megfejtesek értékelését, a helyes megfejtesek nyilvántartását az *Orvosi Hetilap* szerkesztői végzik, s az adatokat továbbítják az egyetemeknek.

Ha kreditpontokat kíván gyűjteni, kérjük, adja meg pecsétszámát, szakterületét és munkahelyét is.

A helyes megoldást a következő havi feladvánnyal együtt, a nyertes nevét a következő havi második számunkban közöljük.

A megfejtesek beküldési határideje: 2020. április 22.

Beküldési cím: Akadémiai Kiadó Zrt., 1519 Budapest, Pf. 245, e-mail: edit.budai@akademiai.hu

OH-KVÍZ – 2020/14. szám

Válassza ki az alábbi lehetőségek közül a megfelelőt!

- Melyik tényező növeli az emlőrák kockázatát?
 - Cukorbetegség.
 - Életkor.
 - Nulliparitás.
 - Mindhárom.
- Mekkora a multicentrikus Castleman-betegség 5 éves túlélése?
 - 81,5%.
 - 21,2%.
 - 34,4%.
 - 12,3%.
- Mi jellemző a gyógynövényeket használókra?
 - Nők.
 - 60 év alattiak.
 - Általános iskolát végzettek.
 - Mindhárom.
- Hány százalékban észlelhetők mononucleosis infectiosában szenvedő betegekben májfunkciós eltérések?
 - 20%.
 - 80%.
 - 25%.
 - 5%.
- Melyik a Gorlin–Goltz-szindróma diagnózisának vezető tünete?
 - Állcsonti keratocysta.
 - Medulloblastoma.
 - Macrocephalia.
 - Ovariumfibroma.
- Melyik a leggyakoribb virális kórokozó autológósejt-transzplantációt követően?
 - Cytomegalovírus.
 - Hepatitis B-vírus.
 - Rotavírus.
 - Epstein–Barr-vírus.
- Melyik kromoszómán helyezkedik el a RET-protonkogén?
 - 9.
 - 10.
 - 11.
 - 12.
- Melyik anyag sterilizálása nem végezhető hőlég-sterilizálással?
 - Gumi.
 - Műanyag.
 - Textília.
 - Egyik sem.
- Mi jellemző a high-grade oncocyta vesetumorra?
 - Férfiakban gyakoribb, mint nőkben.
 - A tumor sokkal nem rendelkezik.
 - A betegek az átlagos veserákos populációhoz képest idősebbek.
 - Mindhárom jellemző.
- A kórházban ellátott felnőttek hány százalékának nem megfelelő a tápláltsági állapota hazánkban?
 - 64%.
 - 25%.
 - 85%.
 - 55%.

A rendezvények és kongresszusok híryanagának leadása

a lap megjelenése előtt legalább 40 nappal lehetséges, a 6 hetes nyomdai átfutás miatt.
Kérjük megrendelőink szíves megértését.

A híryanagokat a következő címre kérjük:
Orvosi Hetilap titkársága: edit.budai@akademai.hu
Akadémiai Kiadó Zrt.