

Lepkegyűjtő tevékenységem tapasztalataiból

JABLONKAI József

Mátra Múzeum, Gyöngyös

ABSTRACT: (What I have experienced collecting butterflies.)
- The author has been collecting butterflies for 65 years. He relates some observations concerning rare butterflies netted by him in Hungary, as well as the circumstances of their occurrence, the plants they feed on, some collecting methods, etc. He calls the attention of younger collectors to the data given by him.

65 éve gyűjtök lepkéket - 13 éves korom óta -. Iskolai és egyetemi tanulmányaim idején, valamint tervező építészeti pályám aktív éveiben ugyan voltak időbeli korlátai ennek a mindig szívesen végzett tevékenységnek, 1958. évi nyugdíjbavonulásom óta azonban folyamatos és intenzív kutatómunkát végezhetek.

E hosszú idő alatt a kezembe került ritkább nagylepke-fajokra vonatkozó adatokat közlöm az alábbiakban, tapasztalat átadás-ként fiatalabb lepkész társaim számára. Ezek az adatok részben saját megfigyeléseim termékei, részben olyanok, amelyekhez én is gyűjtőtársaim révén jutottam. Utóbbiak között vannak azok is, amelyeket a közelmúltban elhunyt kiváló lepidopterológustól: Dr. KOVÁCS Lajostól kaptam olyan területekről, amelyeken magam járatos nem voltam.

+ + +

1. Whitleia undulella TR. - A fóti Somlyóhegy gerincének legerősején IV. hó végén, V. hó elején a fűről nappal felzavarva, röptében kis fehéres mikrolepkének tűnik. Pár lépéssel odébb fűszálra ül ismét, ilyenkor gyűjthető. Szárnyatlan nőtényét és tokját négykézláb kell keresni. Néhány éve a Csepel-szigeten Csév mellett is gyűjtötték még, de a terület megművelésével az állatka innen már eltűnt.

2. Sterrhopteryx fusca HW. (hirsutella HB.) - A Bükk-hegységben a Felsőtárkány feletti Oldal-völgyben V. hó végén gyűjtöttem tokjait vadkerítés oszlopairól 1963-ban. Azóta innen eltűnt. Tokjait megtaláltam a Szarvaskő - Tardosi kőbányák közti autóbusz-út kerékvetőin is. Belőlük VI. hó elején keltek ki az imágók. (Ezt az adatot a Fol. Ent. Hung. 1966. évi 35. kötetének 625-629. oldalán ismertettem.)

3. Procris budensis SPEYER - Az első világháború előtt és néhány évvel utána a Svábhegy (ma Széchenyi-hegy) Budaörs felé eső lejtőjén volt gyűjthető. Ma e helyen már lakóházak állnak. Fogható volt a Csillebércen is, de már e terület beépítését is elkezdték. Nógrád megyében Szécsény mellett a Kőkapu-hegy gerincén LIPTHAY Béla által felfedezett jó gyűjtőterületen az ő kalauzolásával gyűjtöttem 1967. V.30-án.

4. Heterogena asella DEN. et SCHIFF. - Kora este fényre jön, néha tömegesen, fénycsapdába százával. A Bükkben a Felsőtárkány melletti Répás-völgyben 1962. VIII. 8-10-én, a Mátrában a Gyöngyössolymosi Kőzúciónál VII. hó elején gyűjtöttem.

5. Archiearis nota HB. - 1935 előtt a Pomáz feletti Csikóvár-alja tavánál néhány nyárfáról volt gyűjthető. A Bükkben az Eger feletti Mészhegy lábánál gyűjtöttem III. hó végén, IV. hó elején. A Mátrában a Mátrafüred-Vízmű feletti nyárfával elegyes vegyes erdőből vannak példányaim. Itt ritkán gyakorolható módon is gyűjthettem eme éber állatokat: a lótrágyát szivogatókat újjammal lökhettem a gyűjtőüvegbe III. 28-IV. 8. között. Ezidőben a Galyatetőn is gyűjtöttem belőlük.

6. Discoloxia blomeri CURT. - Dr. ISSEKUTZ László és Dr. ANTALFALVI Béla gyűjtötték 1-2 példányát a Mátrában. A mátraházi fénycsapdából van 1 példányom 1969. VIII. 3-áról. A Bükkben is és más vidékeken is gyűjtötték, de mindenütt ritka.

7. Euchoeca nebulata SC. - Nyugaton rendszeresen hozza a fénycsapda. Előkerült a Mátrában és a Bükkben is (Almár, Berva, a Szalajka-ház melletti terület) az V. hó végén, a VI. hó elején.

8. Oporinia autumnata BKH. - 1962. XI. 3-án 1 példány jött fényre az Eger melletti Ostorosi-réten. A nyugati nyíresekben rendszeresen megtalálható.

9. Operophtera fagata SCHARF. - Tömegesen Répáshután és Farkasgyepűn fogható. A Dobogókőn a X. hó végén, a Bükkben a Bálvány alatti Nyírbércen éjjel hálózva ZÖLD Lajossal együtt gyűjtöttem 1961. X.21-én. A mátrafüredi és a mátraházi fénycsapdákból több példányom van a X. hó végéről.

10. Ecliptoptera capitata HS. - A Bükkben a béalápátfalvi Panna-réten jött fényre 1 példány 1962. VI.30-án.

11. Eustroma reticulata DEN. et SCHIFF. - Többfelé, de csak egyenként gyűjthető. A Bükkben a béalápátfalvi Panna-réten ZÖLD Lajos gyűjtött 1960. VII. 29-én fényen 1 példányt. A Mátrában a Sástó mellett 1966. VIII.8-án jött elő 1 példány.

12. Coenocalpe lapidata HB. - Fő gyűjtőhelye Budaörs; ezenkívül néhány példány az egri Szépasszony-völgyből, a Gyöngyös feletti Pipis-hegyről, a budapesti Húvösvölgyből és Zugligetből került elő. A gyűjtés ideje: IX. hó vége, X. hó eleje.

13. Eupithecia silenicolata MAB. - A mátrafüredi fénycsapdában 1968. VI.16-án találtam meg 2 példányát.

14. Eupithecia breviculata DONZ. - A Fót melletti Somlyó-hegyen LENGYEL Gyula és SZALKAY József gyűjtötte 1-1 példányát. Szentendrén a Kőhegyen KOZMA Béláné gyűjtött 3 példányt 1970.VII.12. körül.

15. Eupithecia impurata HB. - Várpalotán a Várvölgy elején LENGYEL Gyulával 1963. VIII.24-én több példányt gyűjtöttünk. A budaörsi Odvas-hegyen is gyűjthető; itt nem ritka.

16. Anticollix sparsata TR. - Mindenütt egyenként gyűjthető. A Bükk-hegységi Harica-völgyből van 1 példányom; 1964. VI.25-én fényre jött.

17. Perizoma bifasciata HW. - 1968. VIII. hó elején gradált; a mátrafüredi fénycsapda 25 példányt hozott.

18. Perizoma parallelolineata RETZ. - Az egri Szépasszony-völgyből 1962. IX. 29-éről, valamint Upponyból 1964. IX. 26-áról van egy-egy példányom. Hegy- és dombvidékeinken ősszel gyűjthető.

19. Chesias rufata F. - Budaörsön az Odvas-hegy lábánál 1968. V. 8-án WETTSTEIN Jánossal együtt nappal gyűjtöttük felzavart példányait. Eger felett az Ostorosi-rétnél ANTAL István társaságában fogtam meg 2 példányát 1963. IV.29-én; ezek fényre röptükben kerültek a hálóba.

20. Schistostege forsteri VOJNITS - A Hármashatárhegy Hűvösvölgy felé eső tisztásain, továbbá a Csillebárcen felzavarható nappal a fűből, VI.hó 26-27-e körül.

21. Lomographa cararia HB. - A Dunántúlon Kaposvár környékén gyűjthető. 1 példányom van a Bükk-hegységi Felnémet feletti Agyagos-tetőről, ez 1965. VI. 22-én fényre jött.

22. Isturgia roraria F. - A Mátrából 1925 óta ismert, ISSEKUTZ László és BALOGH Imre gyűjtötték Mátraszentimre környékén és a Galya alatti tisztásokon, V. hóban. A Bükk-hegységben a Bánkút alatti Ördögoldal nappal felzavarva 1953. VIII. 3-án KOVÁCS Imre társaságában magam is több példányát gyűjtöttem.

23. Itame wauaria L. - A Vértesben, a Bakonyban és a Börzsönyben közönséges. A mátraházi fénycsapdából 3 példányom van az 1969-70. évekből VI.hó végéről, VII.hó elejéről.

24. Elicrinia trinotata METZN. - Ma már mindenütt megtalálható. Fótton fatörzsről nappal V. hó közepén több példányát, a budapesti Városligetben 1945. IV. hóban, Érdligeten nappal lámpaoszlopról, továbbá a Bükk-hegységi Szarvaskőn 1953. V. 18-án ugyancsak nappal egy-egy példányát gyűjtöttem.

25. Hypoxistis pluviaria F. - A nyugati tájakon gyakoribb. Ma-

gam Eger felett, Síkfőkútnál nappal felzavarva 1961. VI. 20-án egy példányát, a Felsőtárkány melletti Oldal-völgyben VII. 2-án 2 példányát gyűjtöttem.

26. Erannis ankeraria STGR. ssp. bervaensis JBL. - A bükki populációt ANTAL Istvánnal együtt fedeztük fel az Eger melletti Berva-bérc déli lejtőjén. Sötétedéskor hálózva, később pedig a fényre repülőket hálózva gyűjtöttük 1963. IV. 5-én, 6-án és 10-én. (A gyűjtés körülményeiről részletes közlésem a Fol. Ent. Hung. 1964. évi kötetének 240-241. oldalán ill. 1965. évi kötetének 521-522. oldalán található.) A lepke 1964 tavaszán gradált, ekkor ANTAL István 4 párat copulálva is gyűjtött. Kitevésztünk sajnos nem sikerült. A lelőhely-területen időközben tar-irtást végeztek, a lepke innen eltűnt.

27. Lycia pomonaria HB. - A budapesti Széchenyi-hegyi lelőhelye általánosan ismert. Előkerült a Vértes-hegységben is, az országos fénycsapda-hálózat várgesztesei csapdájából.

28. Peribatodes umbraria HB. ssp. matrensis VOJNITS - 1911-ben - kezdő gyűjtő koromban - Mátyásföldön, az akkor még létező erdő egyik akácfa-törzséről gyűjtöttem nappal. Fóton a Somlyó-hegyen ugyancsak nappal fenyőtörzsön fogtam meg V. hóban. A Bükk-hegységben a Berva-bércen 1965. V. 26-án fényre jött két példánya.

29. Boarmia viertlii BHTSCH. - A Vértes-hegységben és Uzsán nem ritka, de gyűjtötték az isaszegi erdőben és a Bakonyban is. A Bükk-hegységben az egerbaktai tónál jött fényre több példánya 1962. VII. 18-án, Cserépfalun pedig 1963. VII. 10-én fogtam meg egy példányát.

30. Ectropis consonaria HB. - A nyugati tájakon gyakoribb. A Dobogókő és Dömös közti lejtőn nappal fatörzséről gyűjtöttem 1 példányát 1959. V. 27-én.

31. Campaea honoraria DEN. et SCHIFF. - Nyugaton gyakoribb. KOVÁCS Imre a Pilis-hegy Pilisszántó felé eső lejtőjén 1955. VII. hóban a jelenlétemben gyűjtötte 1 fényre jövő példányát, ISSE-

KUTZ László Mátraszentimrén gyűjtötte ugyancsak fényen. LENGYEL Gyula és ANTALFALVI Béla a Mátraháza feletti Vörösmartyuristaház környékén találkoztak vele. A mátrafüredi Vízműnél elhelyezett fénycsapdámban 1966. VI.18-án és 1968. V. 24-én találtam meg 1-1 példányát.

32. Hylaea prasinaria DEN. et SCHIFF. - Nyugaton közönséges. A Mátrában a Kiszána feletti Kopasz-hegyen gyűjtöttük ANTAL Istvánnal, majd ANTALFALVI Bélával 1966. VI. 18-án, ill. 1969. VI. 22-én.

33. Gnophos pullata DEN. et SCHIFF. forma impectinata GUEN. - A Bükk-hegységben a Bánkút alatti Ördögoldalón 1954. VII. 5-én KOVÁCS Imrével együtt gyűjtöttük fényre jövő 3 példányát. KOVÁCS Imre már egy évvel korábban, 1953. VI. 29-én is megfogta 1 példányát Bükkszentléleknél.

34. Catascia intermedia WHRL. ssp. budensis KOV. - A budaörsi Odvas-hegy szikláin és barlangjaiban nappal is felzavarható a IV. hó végén, az V. hó elején. A Solymár és Nagyszénás közötti kőbánya falain 1960. VI. 6-án LENGYEL Gyulával együtt gyűjtöttem nappal a második nemzedékéhez tartozó 3 példányát. A Várpalota melletti Várvölgy elején 1963. VIII. 24-én fényre jött.

35. Chariaspilates formosaria EV. - Bátorligeten bőven mutatkozik. Az ócsai mocsaras égeres erdőkben fényre jön a VI. hó végén.

36. Dyscia conspersaria DEN. et SCHIFF. - A Budai-hegyekben különösen a budaörsi Odvas-hegyen nappal is felzavarható. Gyűjtöttem még 1-1 példányát Fóton 1958. V. 31-én, a Bükkben Nagyvisnyón 1965. VII. 4-én fényen, a Mátrában a Sástó alatti Eremlény-erdészkunyhónál 1966. VI. 12-én és a pilisvörösvári dombocon, felzavarva 1969. V. 25-én.

37. Euxoa vitta ESP. - A Budaörs melletti Csiki-hegyek Törökugratóval szembeni oldalán fényre jön. Röpködő példány is fogható a VIII. hó végén, a IX. hó elején.

38. Euxoa hastifera DONZ. - A budai Széchényi-hegynek a Csillebérc felé eső oldalán, a Berger-kápolna falán fényre jött 1 példánya VII. hóban. KOVÁCS Lajos Pomázon 1945 őszén zseblámpával napraforgó-tányérokra gyűjtötte.

39. Euxoa segnilis DUP. - Nem ritka alföldi, homoki állat, fénycsapdával könnyen fogható. Fóton 1941. IX.3-án 1 példánya csalétekre jött.

40. Ochropleura praecox L. - Nem ritka. Siófokon 1967. IX. 12-én lámpaszlopról nappal gyűjtöttem 2 példányát. A mátraházi fénycsapda 1970. IX. 19-én 1 példányt hozott.

41. Ochropleura candelisequa DEN. et SCHIFF. - 1 példányát GERGELY István a Budaörs feletti Csiki-hegységben fogta meg.

42. Ochropleura flammatra DEN. et SCHIFF. - Csak egyenként található. A Bükkben a Hármaskútnál 1961. VII. 8-án 1 példánya fényre jött.

43. Rhyacia lucipeta DEN. et SCHIFF. - Egyenként található. A Bükkben a Bánkút alatti Ördögoldalón 1954. VII. 5-én fényre 5 példánya, a bélapátfalvi Panna-réten 1962. VI. 30-án 1 példánya jött.

44. Chersotis multangula DEN. et SCHIFF. - A Csiki-hegységben közönséges; a galaj (*Galium*) virágait szívogatja. A megvilágított lepedőt 2 m-re is megközelíti, könnyen hálózható. A Bükk-hegységben a Harica-völgyben 1964. VII. 18-án 1 példánya jött fényre.

45. Chersotis margaritacea VILL. - A Budaörs mellei Csiki-hegységben IX.10-e körül, Eger felett a Berva-bérc oldalában 1964. IX. 11-én került elő, mindkét helyen fényre jött, utóbbi helyen 4 példány is.

46. Chersotis fimbriola ESP. - Budapesten a Farkasrét alatti Rupp-hegyen fűből felzavarva lámpával gyűjtöttem VI. hó végén.

Fiatal hernyója a leánykökörccsin (*Pulsatilla grandis*)virágkelyhéből gyűjthető.

47. Chersotis cuprea DEN. et SCHIFF. - ZÖLD Lajos közlése: a Bükkben a Nagymezőn VII.hó közepén a délutáni órákban virágokon gyűjthető.

48. Epilecta linogrisea DEN. et SCHIFF. - Kezdő lepkész koromban az akkor még hazánkhoz tartozó (ma csehszlovákiai) Pozsony-szentgyörgy-környéki fenyvesben a túlevelek alól felzavarva VII. hó végén, VIII. hó elején több példányát gyűjtöttem. Törökbálintról is avarból felzavart példányom van. A Mátra-hegységben a kispánai Kopasz-hegyen 1964. VIII. 18-án fogtam meg 1 fényre jövő példányát. A mátraházi fénycsapdából 1969. VIII. 21-éről és 1970. IX. 2-áról van 1-1 példányom.

49. Opigena polygona DEN. et SCHIFF. - Nyugati határunk mentén rendszeresen ősszel mutatkozik. A mátraházi fénycsapda 1970. VII. 12-én, 31-én és IX. hó 2-án fogta 1-1 példányát.

50. Diarsia brunnea DEN. et SCHIFF. - A Bakonytól nyugatra nem ritka. A Bükk-hegységben a Hármaskút alatti Nagygázat-bércen 1964. VII. hóban ANTAL Istvánnal együtt gyűjtöttük több példányát csalétken.

51. Amathea ditrapezium DEN. et SCHIFF. - Nyugaton szintén gyakori. A Bükk-hegységi Uppony környékén 1964. VI. 1-én fényre jött 1 példánya.

52. Mesogona oxalina HB. - Püzesekben mindenütt megtalálható. A Mátrában a kispánai Kopasz-hegyen 1967. VIII. 15-én, Balatonszabadiban nappal villanyoszlopról 1967. IX. 17-én gyűjtöttem 1-1 példányát. Az országos fénycsapda-hálózat tolnai fénycsapdája 1961. IX. 17-én több példányát fogta. FABRICIUS Endrének Fóton fényen sikerült megfognia.

53. Sideridis implexa HB. - LENGYEL Gyula a fóti Somlyó-hegy

Csomád felé eső lejtőjén 1949. V.28-án fényen gyűjtötte 1-1 hím és nőstény példányát.

54. Conisania leineri FRR. - Főleg homokos vidékeken, de másutt is gyűjthető V. és VI. hónapban. Fótról, Peszéréről, Szigetszentmiklósról és Kunfehértóról ismert.

55. Mamestra contigua DEN. et SCHIFF. - A Dunántúlon gyakori. A Bükkben a Hármaskútnál 1964. VII. hóban, a Mátrában a mátraházi és mátrafüredi fénycsapdákból VI. hó végén került elő több példánya.

56. Mamestra cappa HB. - Hazánkban először 1947-48-ban gyűjtötték. Magam Leányfalun VII. hóban fatörzsön, Dunaújvárosban löszfalon, a budai Pálvölgyben ablakpárkányon, a Széchenyi-hegyen a televíziós torony alatti fenyves törzsein ülőt gyűjtöttem, utóbbi helyen két példányát is. Ma talán még Várpalota környékén gyűjthető.

57. Hadena silenes HB. - Homokos vidékek lakója, fényre jön. Fótról (V. hó első fele), Szigetszentmiklósról, Kunfehértóról és Peszéréről ismert.

58. Hadena fligrama ESP. ssp. xanthocyanea HB. - Kezdő lepkész koromban - 1912-ben - Törökbálinton fenyőtörzsekről gyűjtöttem. Fóton a Somlyó-hegy Csomád felé eső lejtőjén gyakori; az akácfa törzsekről nappal gyűjthető V. hó közepétől VI. hó elejéig. Ózdon 1957. V. 29-én tölgytörzsön nappal egy példányát gyűjtöttem, a Mátrában a kisháti Kopasz-hegyen 1965. VI. 2-án fényre jött több példánya. A mátrafüredi fénycsapda 1968. VI. 8-10-én 3 példányt adott.

59. Hadena albimacula BKH. - Ritka lepke. Fóton fenyőtörzsről VI. hó elején, a Bükkben a nagyvisnyói vasútállomás melletti sínjelző kőről 1964. VI.4-én, a Budakeszi-erdő tisztásán tölgytörzsről 1-1 példányát gyűjtöttem, mindig nappal.

60. Hadena magnolii BSD. - Törökbálinton 1912-ben fenyőtörzsről

a VI. hó elején, Fóton 1965. V.30-án gyűjtöttem több példányát. Az Eger melletti Szépasszony-völgyben sötétedés idején ZÖLD Lajos több példányát fogta a habszegfű (*Silene*) virágain. Ilyen időben fény segítségével e virágokról hálózható is. A kismánai Kopasz-hegyen 1965. VI.1-én és 2-án lepedőre jött 9-9 példánya.

61. *Apaustis rupicola* DEN. et SCHIFF. - Gyors röptű, azonnal eltűnő lepke. SCHMIDT Antal Isaszegen VI. hó elején gyűjtötte a kakukkfű (*Thymus*) virágairól. Magam Fóton ugyancsak kakukkfűről 1951. VI. 10-én hálózva gyűjtöttem 2 példányt. A pomázi Kőhegyről 1951. VI. 29-i dátummal van példányom.

62. *Orthosia opima* HB. - A budai Farkasvölgyben IV. hó elején gyakori; nedvcsurgató gyertyánfák törzsén zseblámpával gyűjthető. 1933-35-ben a Farkasrét alatti budaörsi vámórház fala - melyet egész éjjel égő fény világított meg - stabil gyűjtőhelye volt, ülő példányait még reggel is meg lehetett találni. A Bükk-hegységben a Bervában és Upponyban elhelyezett csalétken IV. 3-4-én összesen 4 példányát gyűjtöttem.

63. *Orthosia populi* STRÖM. - Mindenütt megtalálható; Budakeszi környékén és Tolna megyében gyakori. A Bükkben a Bálvány alatti Nyírbércen ANTAL Istvánnal 1963. IV. 20-án fényen és csalétken sorozatot gyűjtöttünk. 1961. IV. 22-én Bervában csalétken fogtam meg 1 példányát.

64. *Cucullia absinthii* L. - Közönséges lepke. Hernyói VIII. hó végén, IX. hó elején már felnőttek, megtalálhatók a fehér ürömön; könnyen kitenyészthetők.

65. *Cucullia argentea* HUFN. - Olyan homokos vidékek lakója, ahol a mezei üröm (*Artemisia campestris*) is megtalálható; hernyói ősszel erről szedhetők. Tatabánya környékéről, Szigetszentmiklósról, Peszéréről, Siófokról, Balatonszabadi és Balatonkenese környékéről jól ismert.

66. *Cucullia lucifuga* DEN. et SCHIFF. - Csak egyenként fordul elő. A Bükk-hegységben a Hármaskút melletti töbröknél 1963. VI.

1-én viharos hideg szélben ANTAL Istvánnal együtt több példányát láttuk elszárguldni megvilágított lepedőnk előtt, de csak egyet sikerült gyűjtenem.

67. Cucullia asteris DEN. et SCHIFF. - Nem ritka lepke. Hernyói ősszel őszirózsa-félék (*Aster limosyris* és *amellus*) virágain található meg, főként éjszaka, de nappal is. Ismertebb lelőhelyei: Ohat, valamint a Törökbálintnál húzódó Törökugrató nevű hegy előtti nedves rét.

68. Cucullia campanulae FRR. - A pilisvörösvári dolomit-dombok erdőszélein található nagy mennyiségben tápnövényén a lila virágú csengetyűkén (*Campanula*). Imágót itt LENGYEL Gyula egyet (1956. VII. 14.), VOJNITS András két hímet gyűjtött. KOVÁCS Lajos és LENGYEL Gyula eredménytelenül keresték itt hernyóit.

69. Cucullia balsamitae BSD. - Homokos vidékeken, pl. Peszéren, Fóton, Szigetszentmiklóson egész nyáron át fényre jön.

70. Cucullia dracunculi HB. - Hernyóit KOVÁCS Imrével VIII. hó 4-én éjszaka a Hármashatárhegyen gyűjtöttük az aranyfürt (*Aster limosyris*) virágairól. Nappal elrejtőzik. Egy imágót a Kőbányai Köztemető egy fatörzséről 1963. VII. 26-án szintén nappal gyűjtöttem.

71. Cheligalea scopariae DORFM. - Hernyói ősszel a seprőürmön (*Artemisia scoparia*) gyűjthetők. Soroksárról, Fonyódról ismert.

72. Calophasia platyptera ESP. - Budatétényben a Kertészeti Kutató Intézet fénycsapdája sok példányát fogta be, pl. 1960-ban 166 db-ot. Másutt nem ilyen gyakori. Az Intézet virág-ültetvényeinek kerítésén VI. 14-én magam is megtaláltam egy példányát. Érdligeten VI. 23-án, VIII. 11-én és 14-én gyűjtöttem 1-1 példányt (utóbbiak a második nemzedékből valók). Leleőhelye volt a Sashegy is.

73. Callierges ramosa ESP. - ISSEKUTZ László fogta az első pél-

dányt a Bükkben, később KÁLLÓ Imre is gyűjtött egyet. A mátraházi fénycsapda 1969. VI. 12-én hozott 1 példányt.

74. Derthisa scoriacea ESP. - 1924-25-ben a budai Sashegy alatt nappal villanyoszlopról több példányát gyűjtöttem IX. hó második felében. A Csiki-hegyekben fényre is jön. Főleg a Dunántúlon gyűjthető.

75. Aporophila lutulenta DEN. et SCHIFF. - Mindenütt csaknem gyakori. X. hó 3-6-a körül alkonyatkor és éjjel repdes és hálózható. Jól ismert lelőhelyei: Fót, Ohat.

76. Lithophane semibrunnea HW. - Főleg Budapest környékéről ismeretes. Egy példányát 1943-ban a mai Gorkij-fasorban egy villa kerítésén fogtam nappal, egyet a Széchenyi-hegyi Úttörő Vasút mentén egy lámpaoszlopon, egy további példányt pedig 1962. X. 7-én Ohaton, csalétken.

77. Lithopane furcifera HUFN. - Lápréti füzesekben nem ritka. KOVÁCS Imre jelenlétemben fogta meg III. hó végén egy áttelelő példányát Pomáz határában a Kevély-hegy lábánál, csalétken. Én a budapesti Angyalföld egy beépített utcájának lámpaoszlopán 1957. III. hó végén nappal, a Bükkben pedig a nagyvisnyói vasútállomás lámpáján 1965. III. 31-én fogtam 1-1 példányt.

78. Egira pulla HB. - A Vértes-hegységben gyakori. A Bükkben Egercsehi mellett fényre több példánya jött 1961. IX. 9-én. 1939-40. IX. 19-e körül Budapesten a hűvösvölgyi Nagyrétre vezető erdei út villanyoszlopairól szintén több példányát gyűjtöttem.

79. Rileyana (Thecophora) fovea TR. - Fót környékén X. 6-a körül a leáldozó nap fénye mellett zümmögő hangot hallatva már rajzanak a hímek, s ráülnek az ember kezére, amelyben kifüggesztésre viszi a csalétkes füzért. A Bükkben Felnémet felett az Agyagos-tetőn gyűjtöttem X. hó 6-a körül. WETTSTEIN János a Hűvösvölgyben, annak Nyék nevű erdőrészében is megtalálta.

80. Meganephria bimaculosa L. - Ohaton IX. hó végén, X. hó elején szilfa-törzsekről gyűjthető nappal. Csalétekre is jön. Így gyűjtöttem belőle a budai Hűvösvölgyben, erdei utak menté szilfás erdőrészben KOVÁCS Imrével VIII. hó végén. A Hűvösvölgy és Ságvári-liget közti út mentén is előfordul; fatörzsről gyűjthető.

81. Dichonia aeruginea HB. - Ritka lepke, csak egyenként található. Hernyója a molyhos tölgyön él. MÉSZÁROS Zoltán Budapesten a Farkasrét alatti Rupp-hegyen csalétken gyűjtötte 1 példányát X.hó második felében. Egerben ANTAL István a város belterületén levő gyümölcsösében kiakasztott csalétken fogott 1 példányt X. hó végén. Magam a Bükk-hegységi Berva-bérc oldalán csalétken 1964. XI. 4-én, az Agyagos-tetőn pedig 1962. X. 6-án gyűjtöttem 1-1 példányt.

82. Blepharita adusta ESP. - 1965. X. 4-én a Berva-bérc oldalán csalétken fogtam meg 1 példányát.

83. Staurophora celsia L. - Az Alföld homokos területein mindenütt előfordul. Örkényben GERGELY István gyűjtötte. Fóton X. 6. körül fényre, csalétekre egyaránt jön. Lámpával a fűvön ülőket is meg lehet találni.

84. Conistra fragariae ESP. - A Bükkben a Bálvány alatti Nyír-bércen ZÖLD Lajos csalétken gyűjtötte 4 őszi példányát. Magam ANTAL Istvánnal a Bervában 1963. IV. 5-én 3 áttelelt példányt, Ózdon 1952. III. 27-én csalétken 1 példányt, a Mátrában a Gyöngyös feletti Pipishegyen VARGA András társaságában 1970.IV. 10-én szintén 1 példányt gyűjtöttem.

85. Conistra ligula ESP. - Nem ritka lepke. Budapesten a Széchenyi-hegyen a fogaskerekű végállomása melletti parkban csalétken 1960. XI. 12-én, 13-án, XII. 10-én és 1961. III. 7-én gyűjtöttem. A Bükkben az Eger melletti Ostorosi-réten 1962. XI. 11-én, majd a Berva-bérc oldalán 1964. X. 30-án és XI. 4-én került a kezembe.

86. Agrochola lota CL. - A nedves rétek füzesein gyakori. Fóton és a közelében levő Alagi-major rétjein X. hó közepén csalétek-re jön, de lámpával a fűzfák ágain ülők is megtalálhatók. Az Eger melletti Töviskes-völgyben 1961-ben, Uppony határában 1963. XI. 6-án gyűjtöttem.

87. Agrochola humilis DEN. et SCHIFF. - Elég gyakori lepke, Ózdon 1953. X.8-án, a Berva-bércen 1965. X. 4-én, a budai Széchenyi-hegyen 1962. X.10-én és Ohaton 1962. X. 7-én gyűjtöttem 1-1 példányát, valamennyit csalétken.

88. Atethmia ambusta DEN. et SCHIFF. - A budai Mártonhegy gyümölcsöseiben régebben közönséges volt. A Csiki-hegyekben 1955. őszén csalétken gyűjtöttem. Hernyója körtén és vadkörtén él.

89. Cirrhia lutea STRÖM. - Gyakori lepke. Nedves rétek kecskefűz bokrai körül rajzik ősszel; este lámpával e bokrokon hálózható is. Az Alagi-major környékén és a fóti réteken X. hó közepén gyűjtöttem.

90. Polyphaenes sericata ESP. - Kezdő gyűjtő koromban - 1911-12-ben - Törökbálinton nappal fatörzsről gyűjtöttem; most megritkultnak vélem e lepkét. A Bükkből a Baktai-tónál 1961. VII. 22-éről van 1 fényre jött példányom.

91. Phodetes morrissi DALE. - Fénycsapda fogta először Velencén. LENGYEL Gyulának VI. hó végén fényre jött Budatétőnyénél, nyárfásban.

92. Hydraecia petasitis DBL. - A Dunántúlról egyenkénti előfordulása ismert. A Bükkben az első példányt ISSEKUTZ László fogta a Garadna-völgyben VIII. hó végén. ZÖLD Lajossal a Felsőtárkány feletti Oldal-völgyben 1961. IX. 18-án és 1964. VIII. 15-én, majd a Mészvölgyben 1964. VIII. 25-én fényre gyűjtöttük. Lámpával járkálva a nagylevelű acsalapuk (Petasites) között a felzavart lepkék hálózhatóak. Hernyója e növény gyökerében él.

93. Enargia abluta HB. - A Budai-hegységből ismeretes, többek

között a Budatétény melletti fénycsapdából is. LENGYEL Gyula 1963. VII. 6-án szintén Budatétényben gyűjtötte.

94. Enargia paleacea ESP. - A Zemplén-hegységben gyakori. Főton KOVÁCS Imre VIII. 8-án a jelenlétemben fogott egyet csalétken. A Bükkben ZÖLD Lajos a Bálvány alatti Nyírbércen gyűjtötte több példányát VIII. hó elején.

95. Sedina büttneri HER. - Ősszel nedves réteken mindenütt előfordul. Kaposvár környékén NATTÁN Miklós fedezte fel. A fóti és az Alagi-major melletti nedves réteken X. hóban fényre jön, de füveken ülve is megtalálható. A Bükkben az Eger feletti Töviskes-völgyben is megtaláltam s ZÖLD Lajossal X. hó 9-e és 25-e között több éven át gyűjtöttem.

96. Nonagria nexa HB. - A Dunántúlon többfelé megtalálható s előkerült az ócsai mocsarasban is. Az egerbaktai tónál 1962. VII. 18-án ZÖLD Lajos fényen fogta meg 1 példányát.

97. Archanara geminipuncta HW. - Fő gyűjtőhelye a Velencei-tó és a Balaton. SCHMIDT Antal 1930-ban egy köteg kb. 25 cm hosszúra vágott nádszárát hozott Vörseről s ezekben a lepke hernyóit. A tenyésztőházban egy pohár vízbe állított nádszálakból két hét múlva keltek ki az imágók.

98. Heliothis armigera HB. (obsoleta F.) - Vándorlepke. 1967. IX. 16-án Siófokon nappal egy lámpaoszlopon fogtam meg 1 példányát.

99. Heliothis scutosa DEN. et SCHIFF. - Az Alföldön egyes években nem ritka. Siófokon 1967. IX. 7-én nappal lámpaoszlopról 2 példányát, Egerben 1961. VI. 20-án nappal falról 1 példányát gyűjtöttem. 1964-ben kitenyésztettem a Bükk-hegységi Uppony határában talált hernyókból; VI. 5-e és VII. 17-e között keltek ki az imágók. RESKOVITS Miklós Egerben falról gyűjtötte 1 példányát 1942. IX. 20-án.

100. Pyrrhia purpurina ESP. - A Vértes-hegységben közönséges.

SZALKAY Józseffel 1960. VI. 4-én Fótton 2 példányát gyűjtöttük fényen, KOVÁCS Imrével 1955. VI. hóban a Széchenyi-hegyi Úttörő Vasút végállomása alatti kis erdei tisztáson szintén megfogtuk 1 példányát. E lepke hernyója az ezerjófű (*Dictamnus albus*) magtokjából táplálkozik.

101. *Leptosia dardouini* BSD. - A mátrafüredi fénycsapda 1966. VII. 3-án és 1968. VII. 1-9-e között 5 példányt hozott. A kisanánai Kopasz-hegyen fényen fogtam 1 példányát 1968. VII. 2-án.

102. *Syngrapha deaurata* ESP. - SZŐCS József VII. 10-én több hernyóját gyűjtötte borkórón (*Thalictrum*) a Somlyó-hegy csomádi oldalán. Gyűjtőtársak - köztük KOVÁCS Lajos - a lepke második nemzedékéből is gyűjtöttek itt, fényen.

103. *Trichoplusia ni* HB. - Vándorlepke; megjelenése kivételes. Érdligeten 1958. VIII. 10-én 1 példányát gyűjtöttem.

104. *Chrysoaspida bractea* DEN. et SCHIFF. - Ritka lepke. A Bükk-hegységben a Vöröskői-völgyben gyűjtöttem nappal, gazosból felzavart példányát 1961. VIII. 12-én, egy másikat a Nagymezőn 1966. VIII. 19-én d.u. 4 óra körül, virágra reptében. A mátraházi fénycsapda 1970. VII. 23-án hozott 2 példányt.

105. *Chrysoaspida chryson* ESP. - A Bükkben Elzalaknál 1962. VIII. 18-án fényen fogtam 1 példányát, a mátraházi fénycsapda 1970. VIII. 6-án hozott 1 példányt.

106. *Autographa iota* L. - Nyugaton közönséges. 1953. VIII. hóban éjjel KOVÁCS Imrével több példányát hálóztuk a Bükk-hegységi Bánkút alatti forrás körül. A mátraházi fénycsapda 1970. VII. 28-án 1 példányt hozott.

107. *Polychrosis moneta* F. - Ezt a szép lepkét először SZŐCS József fedezte fel a budai Irhás-árokban a sisakvirág (*Aconitum*) fiatal hajtásán. WETTSTEIN János társaságában a Dobogókő alatti Kétfükkfa-nyeregben 1967. V. 1-én magam is megtaláltam 3 db hernyóját. Az imágók V. 31-e és VI. 6-a között keltek ki.

108. Ephesia diversa HB. - Az 1910-es évek elején nem volt ritka Törökbálinton, a község feletti - ma is meglévő - erdőben. Itt sikeres délutánon 10-12 példányt is lehetett fogni tölgyfák törzsein. Igen éber állat, csalétekre azonban jön. Repülési ideje VIII. 8-a körül van. Törökbálintról 1959-ből és 1962-ből vannak példányaim. 1953-ban KOVÁCS Imrével gyűjtöttem néhányat a Farkasrét alatti Rupp-hegyen, csalétekkel. ZÖLD Lajos Egercsehi közelében a jelenlétemben 1961. IX. 9-én fogott - szintén csalétekkel - 1 példányt. A Mátrában a kismánai Kopasz-hegyen 1967. VIII. 14-én jött csalétekre egy példány.

109. Catephia alchymista DEN. et SCHIFF. - Csak egyenként fogható. Fótton 1950. V. 26-án nappal, akácfatörzsön 1 példányt, LENGYEL Gyulával a Farkasrét feletti Csillebércre vezető lejtőn 1935. VII. hóban csalétken 3 példányt, a Bükkben a Felnémet feletti Agyagos-tetőn 1964. VII. 29-én csalétken 1 példányt, a Bervában 1965. V. 26-án csalétken 1 példányt, a Mátrában a Sás-tónál levő kerítés faoszlopairól 1965. V. 26-án nappal 2 példányt gyűjtöttem.

110. Epizeuxis calvaria F. - Bükkszentlélek mellett 1953. VII. hó elején csalétek segítségével KOVÁCS Imre fogta meg 2 példányát.

111. Hypena obesalis TR. - Csak egyenként fogható. Kerecsend mellett gyűjtöttem 1 példányát 1952. V. 27-én, fényen.

112. Paidia murina HB. - Az Eger feletti Forrókúton 1962. VIII. hóban, Uppony határában 1963. VIII. 6-án gyűjtöttem 1-1 példányt; fényre jöttek.

113. Comacla senex HB. ssp. karjavszkyi DIÓSZ. - Nem ritka lepke; nádasokból jön elő fényre. A Bükk-hegységben a Bánkút alatti Ördögoldalón 1953. VII. 1-én fogtam meg 1 példányát, Dinnyés mellett a Velencei-tó nádasából 1966. V. 20-án több példány jött fényre. Ócsán is gyűjthető VI. 26-28. körül.

114. Endrosa roscida DEN. et SCHIFF. - Nem ritka lepke. A Pi-

lisvörösvár melletti dolomit dombokon nappal a fűből felzavarható. 1959. V. 20-áról és 1969. V. 25-éről van több példányom.

115. Atolmis rubricollis L. - A Zempléni-hegységben otthonos. 1948-ban KOLTAI Henrik jelenlétében hálózott egy fűből felzavart példányt a csomádi vasútállomás mögötti akácok szélén, VI. hó elején.

116. Ocnogynna parasita HB. - Közönséges lepke; III. hó végén, IV. hó elején fényre jön. Régi gyűjtők a budai Hűvösvölgyben az Ördög-árok még nyitva levő partjain gyűjtötték. A budapesti Természettudományi Múzeum gyűjtőcsoportja sokat befogott a Hársborkor-hegyen. Az ország minden részében a fénycsapdák hozzák. BALOGH Imre Pécs környékén gyűjtötte, magam a Bükkben is megtaláltam; a Mátrában azonban még nem sikerült találkoznom vele.

117. Chelis maculosa GERN. - Nem ritka lepke; hajnali 3 óra körül repül a lepedőre. Így gyűjtöttem KOVÁCS Imrével az isaszegi erdő szélén 1953. VII. hóban, LENGYEL Gyulával a várpalotai Vár völgy elején 1963. VIII.25-én 3-3 példányt, Leányfalun 1948. VI. hó végén, és Veszprém belterületén 1945-ben nappal 1-1 példányt. Hernyóját Fót környékén IV. hó elején hajtásnak induló Galium-on gyűjtöttem s megtaláltam a Bükk-hegységben is, a Bükkszentmárton melletti fennsíkban.

118. Diaphora virginica F. - Északamerikából behurcolt lepke. A Csepel-szigeten honosodott meg; itt MÉSZÁROS Zoltán talált rá és figyelte éveken keresztül. Innen van 1 példányom 1958. VIII. 1-ről.

119. Rhyarioides metelkana LED. Tápnövénye egy lórom-féle (Rumex aquaticus). A Duna-Tisza közti mocsaras területek lecsapolásával e szép lepke is évtizedekre eltűnt. Még 1939 körül gyűjthető volt Peszér-pusztán, Gyónon. Felnőtt hernyóját KOVÁCS Lajossal a gyóni mocsárban VI. 22. körül gyűjtöttük, amikor már a tápnövény levelét felfelé kunkorítva laza gubót készített. VII. hó elején keltek ki az imágók. 1972-ben Dr. GOZMÁNY László új lelőhelyét fedezte fel a Duna-Tisza közén.

120. Orgyia ericae GERM. - ANTALFALVI Bélával 1969. VI. 29-30-án gyűjtöttük a Pest-megyei Bócsa község határában a rozmaring füzön (*Salix rosmarinifolia*) hernyóit és laza szövésű gubóit. Belőlük nagyobbbrészt csökevényes szárnyú nőstények keltek ki.
121. Laelia coenosa HB. - Dinnyés mellett a Velencei-tó nádasai-
saiból, de a Balatonnál és Ócsán és fényre jön. 1948. VII. 28-
áról, 1966. VII. 30-áról és VIII. 7-éről vannak példányaim.
122. Philodoria potatoaria L. - Nyugati vidékeinken kívül Ócsán is tömegesen gyűjthető. Peszérpusztai és gyóni nádasok szélén talált hernyóiból imágókat neveltem ki. A hernyó nappal, a nád-szárakon ül.
123. Polyploca flavicornis L. - ANTAL Istvánnal 1963. IV. 20-án gyűjtöttük; fényre és csalétekre jött a Bükkben a Bálvány-csúcs alatti Nyírbércen, nyíres közelében. ANTAL 4 példányt, én kettőt fogtam. Sopron környékén is mutatkozik.
124. Ochrostigma velitaris HUFN. - LENGYEL Gyula jelenlétemben fényen fogta meg 1 példányát a főtí Somlyó-hegy Csomád felé eső lejtőjén VII. hóban. Csak kivételesen fordul elő hazánkban.
125. Phalera bucephaloidea O. - Molyhos tölgyesekben él. ANTAL Istvánnal a Felnémet feletti Agyagos-tetőn gyűjtöttük 1 nőstény példányát VII. 20-án. 1947-ben Leányfalun egy tölgytörzsön ülő példányát ejtettem nappal zsákmányul.
126. Charcharodus lavatherae ESP. - Peszéren, Rákoson közönsé-
ges. MAJTHÉNYI Gábor 1942. VI. 21-én több példányát gyűjtötte.
127. Thymelicus acteon ROTT. - 1953-ban a budai erdőben - így a Hűvösvölgyben is - gyakori volt. Itt én még 1943-ban 1 példányát, azután Érdligeten 1957. VII. 14-én, majd Visegrádon a hajóállomásnál 1959. VII. hó végén 1-1 példányát, Pilisszent-lászló határában kis erdei tisztáson pedig VIII. hó elején 6 példányát fogtam meg.

128. Pieris manni MAYER ssp. reskovitsi SZABÓ - RESKOVITS Miklós fedezte fel a Bükkben. Mindkét nemzedékéből szép sorozatok vannak a budapesti Természettudományi Múzeumban. Magam az Almár-völgyben 1961. VI. 18-án, a következő napon a Berva-völgyben, a Harica-völgyben pedig 1964. VII. 19-én gyűjtöttem 1-1 példányát; valamennyi hím.

129. Aricia artaxerxes F. (allous GEYER-HB.) ssp. issekutzi BALOGH - A Bükk-hegységben Bánkúton 1955. VII. 3-án, a Nagymezőn 1965. VII. 6-án 1-1 példány, VIII. 21-én 7 példány került elő. Jósvafőn is gyűjtötték.

130. Agrodiaetus admetus ESP. - A Hármashatárhegy Óbuda felé eső lejtőjének tisztásain VII. 20-a körül - az utóbbi években ritkábban - fogható. A Bükk-hegységben Uppony határában 1964. VIII. 14-én 1 nőtény, 1965. VII. 22-én több hím példányát gyűjtöttem. ANTALFALVI Béla Nógrád-megyében a Szécsény melletti Kőkapunál találta meg.

131. Clossiana titania HB. - Egyetlen hazai példányát 1938. VII. 10-én MAJTHÉNYI Gáborral együtt fogtam a Felsőtárkány-Síkfőkút közti erdei út tisztásán, az akkor még létező GALASSY-féle erdészház közelében. Azóta is kerestem itt, de eredménytelenül.

132. Argyronome laodice PALL. - SZABÓ Richard Lillafüred közelében találta meg először, majd a Harica-völgyben ZÖLD Lajos. Utóbbi helyen magam is több példányát gyűjtöttem 1964. VII. 19-én. A Zemplén-hegységben gyakori. MAROSHÁZY Lajos a Mátrában is fogta.

133. Comma l-album ESP. - RESKOVITS Miklós a Felsőtárkány melletti Oldal-völgy felső végében gyűjtötte. Többször is felkerestem e helyet, de nem találtam meg ezt a lepkét. Kaposvár környékén PAZSITZKY Sándor és NATTÁN Miklós gyűjtötték.

134. Limenitis populi L. ssp. bucovinensis HORM. - A Bükk-hegységben VI. hó elejétől VII. hó közepéig gyűjthető az Oldal-völgyben, Síkfőkútnál, a Garadna-völgyben, a Moldva- és a Recem-

völgyben. Utóbbi helyeken tápnövényét, a rezgő nyárfát (*Populus tremula*) teljesen kiirtották, s ezzel ez a szép lepke innen eltűnt. Az Oldal-völgyben egyébként ANTAL István VI. 1-én fogta meg egy példányát. Magam a mátrafüredi Vízmű előtti területen 1968. VII. 9-én egy hím példányát gyűjtöttem.

135. Coenonympha oedipus F. - 1917-ben a budai Római-fürdőnél még gyakori volt, Ócsa környékén az Alsónémedi felé húzódó nedves réteken még ma sem ritka; itt 1966. VI.23-án több példányát gyűjtöttem.

136. Hyponephele lupinus COSTA - Homokos területek lepkéje. Megtalálták Fóton, Peszérpusztán. ANTALFALVI Bélával szép sorozatot gyűjtöttünk a Pest-megyei Bócsa község határában 1969.VI. 30-án.

137. Lopinga achinae SC. - 1916-ban a budai Húvösvölgyben, 1917 körül Gödöllő környékén - így a mogyoródi erdőben is - gyűjthető volt. LENGYEL Gyula Budakeszi határában is rátalált, újabban itt nyoma veszett. A Bükk-hegységben RESKOVITS Miklós fedezte fel 1961. VI. 26-án a Felsőtárkány feletti Oldal-völgy felső végében. 1962. VI. 23-án itt még én is több példányát gyűjtöttem, amióta azonban a területen műút épült, a lepke innen eltűnt, évek óta hiába keressük.

138. Neochipparchia statilinus HUFN. ssp. norica VTY. - A fóti Somlyó-hegység a tó felőli oldalában húzódó ritkás fenyvesben VIII. 20. körül gyűjthető. A szigetszentmiklósi bokros területeken a homokban felcsukott szárnyakkal lapul, felzavarása után néhány lépéssel odébb újra leül. Ismert gyűjtőhelyei még a csépelei Királyerdő és Peszér. Fótról 1952. VIII. 16-áról és 1957. IX. 1-éről van példányom. GAÁL István Cinkota határában az Ilona-telep melletti volt kavicsbányában gyűjtötte 1938. VIII. 18-án; azóta ez a terület is beépült már.

+ + +

Lényegesebbnek ítélt adataim közreadásakor szeretettel és tisztelettel emlékezem meg azokról a gyűjtőtársaimról is, akikkel évtizedeken keresztül sok közös "vadászélményt" éltem át, s akik közül sokan már nincsenek életben. Szívesen gondolok a terepen velük töltött időkre, amelyek azonkívül, hogy megtanítottak bennünket a természet szeretetére, szépségeinek, értékeinek igaz megbecsülésére, sokszor ösztönözték mély, életre szóló barátságok keletkezésére is. Szívesen emlékezem a Rovartani Társaság évtizedeken át minden hó harmadik péntekjén megtartott szaküléseire, a budapesti Természettudományi Múzeum lepkegyűjteményében szombat délutánonként rendszeresített "gyorshatározási" alkalmakra - amelyek az amatőr lepkészek kitűnő továbbképzési lehetőségei voltak -, s azután az ezeket követő, a megszokott csendes vendéglőben pipafüst s egy-egy pohár ital mellett lezajló kedélyes baráti összejövetelekre, ahol rendszeresen tájékoztattuk egymást "szenzációs" új eredményeinkről s terveztük meg következő együttes gyűjtőútjainkat. Kár, hogy múltban vannak ezek a szép élményeket termő alkalmak. Nem kellene-e fellevenítésükre a fiatalabb generációnak gondolnia?

Érkezett: 1973. IX. 6.

JABLONKAI József
Mátra Múzeum
H-3200 Gyöngyös