

Szakmai beszámoló

OTKA K-49516

A projekt keretében elért eredményeket egyrészt a 34 elemű közleményjegyzék tartalmazza, másrészt születtek még nem publikált eredmények is. A fontosabbnak tartott eredményeket (van közöttük megjelent és benyújtott) soroljuk fel az alábbiakban.

Hatvani László (társszerzők: Bánhelyi Balázs, Csendes Tibor, Garay Barna) elsőként bizonyították súrlódásos ingamozgást külső periodikus erő hatására leíró másodrendű differenciálegyenlet megoldásainak kaotikusságát. J. Hubbard (1999) numerikus vizsgálatok alapján fogalmazta meg az

$$x'' + 10^{-1}x' + \sin x = \cos t$$

egyenletre a problémát. Hatvani László társszerzőivel [SIAM J. Appl. Dyn. Syst. 7(2008), 843-867] azt mutatta meg, hogy van megoldásoknak egy osztálya, amely kaotikus a következő értelemben. Minden $-1, 0, 1$ -ből álló $(a_k)_{k \in \mathbb{Z}}$ végtelen sorozathoz van olyan megoldása az egyenletnek az adott osztályban, hogy bármely $k \in \mathbb{Z}$ -hez $a_k = -1$ esetén ez a megoldás az inga azon mozgását írja le a $(2k\pi, 2(k+1)\pi)$ időintervallumon, amely pontosan egyszer megy át az alsó pozíció az óramutató járásával megegyező irányban, $a_k = 1$ esetén az inga azon mozgását írja le a $(2k\pi, 2(k+1)\pi)$ időintervallumon, amely pontosan egyszer megy át az alsó pozíció az óramutató járásával ellenkező irányban, míg az $a_k = 0$ esetben az inga nem megy át egyszer sem az alsó pozíció a $(2k\pi, 2(k+1)\pi)$ időintervallumon. A bizonyítás a Mischaikow, Mrozek, Zgliczynski által kidolgozott topologikus indexet alkalmazza. Azonban a bizonyítást lényegesen leegyszerűsíti egy megfelelő átmenetgráf definiálása, amely lehetővé teszi a Brouwer-féle fixpont-tétel használatát a Conley-index helyett. A bizonyításban fontos szerepe van az intervallum-aritmetikán alapuló megbízható numerikus számításoknak is.

A nagyon egyszerűnek tűnő

$$x'' + a^2(t)x = 0$$

lineáris másodrendű számos megoldatlan probléma van. Egy x_0 megoldás kicsi, ha $\lim_{t \rightarrow \infty} x_0(t) = 0$. Ismert, hogy mindig van nemtriviális kis megoldás. Az Armellini–Tonelli–Sansone-tétel szerint minden megoldás kicsi, ha a regulárisan tart a végtelenbe. Ennek érdekes általánosítását adta Hatvani László [Georgian Math. J. 14(2007), 269-278]. Azzal az esettel is foglalkozott, amikor $a(t) = a_k$, $t_{k-1} \leq t < t_k$, ahol az (a_k) sorozat adott és a $\tau_k = t_k - t_{k-1}$ formulával definiált (τ_k) sorozat elemei független valószínűségi változók a $[0, 1]$ intervallumon egyenletes eloszlással. A megoldások amplitudóinak majdnem biztosan nullához tartására, instabilitására adott elegendő feltételeket megjelenés alatt álló dolgozataiban:

L. Hatvani, A new method in stability theory of linear non-autonomous second order differential equations with step function coefficients, In: Advances in Math. Problems in Eng. Aerospace and Sci. (to appear).

L. Hatvani, Stochastic parametric resonance in a linear oscillator at square-wave modulation, In: Problems in Analytical Mechanics and Stability Theory (to appear).

Hatvani László és N. Guglielmi [Discrete Cont. Dyn. Syst. 20(2008), 911-926] holonóm mechanikai rendszerekre is vizsgálta a kis megoldások létezését. Ha az együtthatófüggvények lépcsősek, akkor a probléma diszkrét dinamikai rendszerre redukálható.

Az

$$x'' + a(t)|x'|^\alpha \operatorname{sign}(x') + f(x) = 0$$

nemlineáris oszcillátort vizsgálta Karsai János (és J.R. Graef [Discrete Cont. Dyn. Syst. 2005, 497-504; Nonlinear Oscillations, 8(2005), 186-200]) a szuperlineáris $\alpha \geq 1$ és a szublineáris $0 < \alpha < 1$ esetben. Megmutatták, hogy a két esetben a megoldások viselkedése nagyon különböző.

A projekt keretében sokat vizsgáltuk a

$$\dot{x}(t) = -\mu x(t) + f(x(t-r)) \quad (1)$$

egyenletet, ahol $\mu \geq 0$, $r > 0$, $f \in C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, $f(0) = 0$. Minden $\phi \in C = C([-r, 0], \mathbb{R})$ -re van egyetlen $x = x^\phi : [-r, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos függvény, amely differenciálható $(0, \infty)$ -en, kielégíti (1)-et minden $t > 0$ -ra, és $x|_{[-r, 0]} = \phi$. Az $F(t, \phi) = x_t$, $x_t(s) = x(t+s)$, $s \in [-r, 0]$, relációk egy $F : [0, \infty) \times C \rightarrow C$ végtelen dimenziós szemidinamikai rendszert definiálnak. Az $A \subset C$ halmaz az F globális attraktorának evezük, ha A kompakt, invariáns, és A vonzza a C minden korlátos részhalmazát. A vizsgálatok fő célja (1) globális attraktora szerkezetének a minél teljesebb leírása.

Tegyük fel, hogy $f' < 0$ és f vagy alulról vagy felülről korlátos. Például a híres Wright-féle egyenlet ilyen. Linearizáljuk (1)-et a 0 fixpontban: a $(D_2F(t, 0))_{t \geq 0}$ lineáris C_0 -félcsoport generátorának spektruma megegyezik a $\mathbb{C} \ni \lambda \mapsto \lambda + \mu - f'(0)e^{-\lambda} \in \mathbb{C}$ karakterisztikus függvény zéróhelyeivel. Tegyük fel, hogy $2k$ pozitív valós részű sajátérték van. Jelölje W_{lok} a hozzájuk tartozó lokális instabil sokaságot 0-ban. Legyen $W = F([0, \infty) \times W_{lok})$. A W lezártja, a \overline{W} halmaz része az A globális attraktornak, amely létezik ez esetben. A

T. Krisztin and J.Wu, Global structures for delayed monotone feedback, 150 pages, submitted.

monográfiában megadjuk \overline{W} finom szerkezetét. \overline{W} tartalmazza a 0 egyensúlyi helyzetet, pontosan k periodikus pályát: $\mathcal{O}_1, \dots, \mathcal{O}_k$, továbbá heteroklinikus pályákat 0 és a periodikus pályák között, és bizonyos periodikus pályák között. Definiáljuk a

$$C_j^0 = \{\phi \in \overline{W} : \text{Van } x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ \text{megoldás, amelyre } x_0 = \phi, \alpha(x) = \{0\}, \omega(\phi) = \mathcal{O}_j\},$$

$$C_l^j = \{\phi \in \overline{W} : \text{Van } x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ \text{megoldás, amelyre } x_0 = \phi, \alpha(x) = \mathcal{O}_j, \omega(\phi) = \mathcal{O}_l\}$$

ún. összekötő halmazokat, ahol $j, l \in \{1, \dots, k\}$. Ekkor

$$\overline{W} = \{0\} \cup \left(\bigcup_{j=1}^k \mathcal{O}_j \right) \cup \left(\bigcup_{j=1}^k C_j^0 \right) \cup \left(\bigcup_{1 \leq l < j \leq k} C_l^j \right).$$

Továbbá az összekötő halmazok C^1 -sima részsokaságai a C fázistérnek. Az \mathcal{O}_j periodikus pályát definiáló megoldás szegmensének $2j - 2$ vagy $2j - 1$ előjelváltása van a $[-r, 0]$ intervallumon, $j \in \{1, \dots, k\}$. Ezen eredmények bizonyítása egyrészt hasonló az 1999-es

Krisztin–Walther–Wu monográfiában kidolgozottakhoz, másrészt új ötletek, módszerek is szükségesek. Az alkalmazott eszközökből: invariáns sokaságok, inklinációs lemmák, diszkrét Ljapunov függvények, Floquet együtthatók, transzverzálítás. Hangsúlyozzuk, hogy az $\mathcal{O}_1, \dots, \mathcal{O}_k$ periodikus pályák hiperbolicitása nem ismert, és ez komoly technikai nehézséget okoz. Eredményünk egy korábbi változata periodikus pályák közötti heteroklinikus pályák létezésére Conley-indexet alkalmazott. Kiderült, hogy az egyszerűbb Brouwer-index is elegendő.

Az (1) egyenletet a $\mu = 0$, $f(x) = \alpha(e^x - 1)$, $\alpha > 0$ esetben Wright-egyenletnek is nevezik. Jelentős előrelépést értünk el E.M. Wright 1955-ből származó sejtésének az igazolásában, amely szerint $\alpha r < \pi/2$ esetén a 0 megoldás globálisan attraktív. A benyújtáshoz közeli állapotú

B. Bánhelyi, T. Csendes, T. Krisztin and A. Neumaier, Global attractivity of the zero solution for Wright’s equation, kézirat

dolgozat a sejtést a kérdéses $[3/2, \pi/2)$ intervallum 90%-ára igazolja.

A benyújtás előtt álló

T. Krisztin and G. Vas, Large periodic orbits for delayed monotone positive feedback, kézirat

dolgozat arra ad példát, hogy az (1) egyenletre az $f' > 0$ esetben nagy periodikus pályák is lehetnek, azaz nem feltétlenül vannak két szomszédos stabil egyensúlyi helyzet által meghatározott rendezési intervallumban.

Az (1) egyenletre vonatkozó eredménynek egy speciális rendszerre, gyűrűszerűen rendezett idegsejt-hálózatot modellező rendszerre analóg változatának kidolgozása folyamatban van.

Az (1) egyenletet vizsgálta Röst Gergely (és J. Wu [Proc. Roy. Soc. London Ser. A 463(2007), 2655-2669.]) nemmonoton f esetére. Egy ún. unimodális f -re (azaz f monoton növekvő egy maximumhelyig, majd monoton csökkenő) a globális attraktor létezését igazolták, és korlátot adtak az attraktorra. Attraktív intervallumokat konstruáltak, és elegendő feltételeket adtak arra, hogy minden megoldás belépjen abba az intervallumba, ahol $f' < 0$ teljesül, és így a monoton visszacsatolásra vonatkozó eredmények alkalmazhatók. Bizonyos heteroklinikus pályák létezését is igazolták. Az eredmények alkalmazhatók a Nicholson és a Mackey–Glass egyenletekre. A globális attraktorra kapott becslések élesek, ha a nemlineáris f -re az unimodális feltétel mellett az is teljesül, hogy a Schwarz-deriváltja negatív [E. Liz and G. Röst, Discrete Cont. Dyn. Syst., to appear].

Az

$$\frac{d}{dt}[x(t) - cx(t-s)] = -\mu x(t) + f(x(t-r))$$

alakú neutrális funkcionál-differenciálegyenletre a megoldások generikus konvergenciáját igazoltuk:

A. Borús and T. Krisztin, Monotone semiflows generated by neutral delay differential equations, benyújtva.

Tekintsük az

$$\dot{x}(t) = \gamma [a(t)x(t) + g(t, x(t-r))]$$

egyenletet, ahol $\gamma > 0$ paraméter, $a(t)$ és $g(t, x)$ ω -periodikusak t -ben, $a(t) \leq 0$, $g(t, 0) = 0$, $\frac{\partial}{\partial x}g(t, x) > 0$ (vagy < 0) minden (t, x) -re. Röst Gergely 2006-ban megvédett PhD értekezésének fő eredménye szerint ha $\omega = r$, akkor a γ paraméter kritikus értékeire a periódus-

leképezésre nézve invariáns görbék bifurkálnak a 0 egyensúlyi helyzetből (Neimark–Sacker bifurkáció). A kibővített fázistérben ez invariáns tóruszok megjelenését jelenti. Ezen eredményeket rezonanciák esetére is kiterjesztette Röst Gergely.

Ha (1)-ben r nem állandó, hanem állaptofüggő, pl. $x(t)$ függvénye, akkor nem triviális technikai nehézségek vetődnek fel az alaperedmények (létezés, egyértelműség, folytonos függés) bizonyításában és a kvalitatív vizsgálatokban (stabilitás, linearizálás, periodikus pályák, invariáns sokaságok, globális attraktor, Hopf-bifurkáció, stb.) egyaránt. Állapotfüggő késleltetésű egyenletek egy, a fenténél lényegesen bővebb osztályára a

F. Hartung, T. Krisztin, H.-O. Walther and J. Wu, Functional differential equations with state-dependent delays: theory and applications, Handbook of Differential Equations, ODE Vol. 3, Elsevier–North Holland, pp. 435-545, 2006.

könyvfejezet az első összefoglaló feldolgozása a témakörnek elsősorban a szerzők korábbi eredményei alapján. De fontos új eredményeket is tartalmaz: egy egységes keretben tárgyalhatók az addig ad hoc módon kezelt problémák. A dinamikai rendszerek elméletébe illeszthetők az állapotfüggő késleltetésű egyenletek, ha azokat egy alkalmas sokaságon vizsgáljuk. A linearizálás, a lokális invariáns sokaságok létezése azonban speciális nehézséget jelentenek a megoldásoperátor simaságának hiánya miatt. Különösen fontos a lokális bifurkációelméletben a centrális sokaságok simasága. Ezt tartalmazza C^1 -simaságra [T. Krisztin, Fields Institute Communications 48(2006), 213-226.], az általános esetet bizonyítja:

T. Krisztin, Smooth center manifolds for FDEs with state-dependent delays, submitted.

Az alkalmazások szempontjából is fontos eredményeket ért el Röst Gergely: vírusok terjedését modellezték differenciálegyenletek segítségével; járványok visszaszorítására kidolgozandó stratégiák tervezésének elméleti alapjait igazolták a modellegyenletek vizsgálatával.

Összességében a 7 fős csoport kutatói tevékenységét eredményesnek mondható. Különböző okok miatt a csoport 3 tagjának aktivitása elmaradt a tervezettől. Bartha Máriát betegsége hátráltatta. Öröndetes viszont, hogy a projekt időtartama alatt több hallgatót sikerült a kutatómunkába bevonni. Röst Gergely 2006-ban védte meg PhD értekezését Krisztin Tibor témavezetésével. További 4 PhD hallgató dolgozik Hatvani László és Krisztin Tibor témavezetésével.

2007-ben sikeresen megrendeztük az 8th Colloquium on the Qualitative Theory of Differential Equations (Szeged, June 25-28, 2007) nemzetközi konferenciát.