


# ERRÁTUM

## Statin gyógyszereszedési gyakorlat myocardialis infarctus után Magyarországon

Tomcsányi János dr.

Az *Orvosi Hetilap* 2017. március 26-án megjelent 12. számának közleményében (2017; 158: 443–446.) a 3. ábra hibásan jelent meg.


Hibás:



3. ábra

2013-ban beválogatott, adott hónapban életben lévő, statin-monoterápián lévő betegek terápiás dózis és adherencia szerinti megoszlása. A nagy dózisú statint a 80 mg atorvastatin és 40 mg rosuvastatin, míg a közepes dózist a 40 mg atorvastatin és 20 mg rosuvastatin jelentette

Az ábra helyesen:



3. ábra

2013-ban beválogatott, adott hónapban életben lévő, statin-monoterápián lévő betegek terápiás dózis és adherencia szerinti megoszlása. A nagy dózisú statint a 80 mg atorvastatin és 40 mg rosuvastatin, míg a közepes dózist a 40 mg atorvastatin és 20 mg rosuvastatin jelentette


# ERRATUM

## Adherence to statins in patients with myocardial infarction in Hungary

Tomcsányi János dr.

In the article published on March 26, 2017, in Issue 12 of *Orvosi Hetilap* (2017; 158: 443–446.) chart No. 3 was published defectively.


Incorrect



3. ábra

2013-ban beválogatott, adott hónapban életben lévő, statin-monoterápián lévő betegek terápiás dózis és adherencia szerinti megoszlása. A nagy dózisú statint a 80 mg atorvastatin és 40 mg rosuvastatin, míg a közepes dózist a 40 mg atorvastatin és 20 mg rosuvastatin jelentette

Correct



3. ábra

2013-ban beválogatott, adott hónapban életben lévő, statin-monoterápián lévő betegek terápiás dózis és adherencia szerinti megoszlása. A nagy dózisú statint a 80 mg atorvastatin és 40 mg rosuvastatin, míg a közepes dózist a 40 mg atorvastatin és 20 mg rosuvastatin jelentette